
UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 1

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Bivio Cerro della Croce

Superfici	Assestamentale totale	5,0164
	produttiva	4,9344
	improduttiva	0,0820

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 1010 metri. Esposizione prevalente a sud. Pendenza prevalente del 35 %, accidentalità debole.

Possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti strade camionabili, piste forestali.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Produttivi non boscati 1,82 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero, Acer (genere), Roverella, Orniello, Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: CERRETA CON ALTRE LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 7 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Rovo, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

perseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 15 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 120 i valori si riferiscono alle matricine i valori si riferiscono alle matricine

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 2

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Valle Medico

Superfici	Assestamentale totale	
	produttiva	9,5485
	improduttiva	9,5104
		0,0381

Fattori ambientali e di gestione

Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 990 metri. Esposizione prevalente ad est.

Pendenza prevalente del 35 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Danni lievi causati da sovrapascolamento.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti strade camionabili, piste forestali.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero, Acer (genere), Roverella, Orniello, Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: CERRETA CON ALTRE LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 4 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Rovo, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

ceduazione

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 15 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 120 i valori si riferiscono alle matricine i valori si riferiscono alle matricine

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 3

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Valle Medico - Valle Crognale

Superfici	Assestamentale totale	23,4510
	produttiva	22,8511
	improduttiva	0,5999

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 1010 metri. Esposizione prevalente a sud. Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti strade camionabili, piste forestali.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Produttivi non boscati 2,52 ha circa.

Descrizione fisionomica-culturale

Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero, Acer (genere), Roverella, Orniello, Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: CERRETA CON ALTRE LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 8 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Rovo, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 15 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 120 i valori si riferiscono alle matricine i valori si riferiscono alle matricine

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 4a

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Sopra Sorgente Belvece

Superfici	Assestamentale totale	12,6093
	produttiva	12,6028
	improduttiva	0,0065

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 1000 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti strade camionabili, piste forestali.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Produttivi non boscati 1,36 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero, Acer (genere), Roverella, Orniello, Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: CERRETA CON ALTRE LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 2 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Rovo, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

ceduazione

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 15 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 120 i valori si riferiscono alle matricine i valori si riferiscono alle matricine

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 4b

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Ara Comune

Superfici	Assestamentale totale	
	produttiva	3,4777
	improduttiva	3,4737
		0,0040

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 1000 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Produttivi non boscati 0,26 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero, Acer (genere), Roverella, Orniello, Faggio, Carpino bianco, Sorbus (genere) (Tipo: CERRETA CON ALTRE LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 35 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione con rilascio di 90 matricine ad ettaro di cui 1/3 di età doppia del turno da effettuare entro 5 anni.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 11.7 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 2375

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 5a

COMPRESA: Fustaie a prevalenza di cerro

Comune Contigliano

Località Monte Rocca

Superfici	Assestamentale totale	
	produttiva	11,3014
	improduttiva	11,2081
		0,0933

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 950 metri. Esposizione prevalente a sud-ovest.

Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: pascolo in bosco di bovini, sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Produttivi non boscati 0,6 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine Faggio, Roverella, Orniello, Acer (genere), Leccio, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 60 anni. Novellame assente nella porzione a valle, in prossimità della sorgente Belvedere, il popolamento assume la struttura di una fustaia transitoria.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Ginestra odorosa, presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

naturalistiche o conservative.

Orientamento selvicolturale

conversione ad alto fusto.

Ipotesi di intervento

avviamento da effettuare entro 5 anni.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 19 cm; altezze prevalente 15 m; N° piante/ha 1380

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 5b

COMPRESA: Formazioni arbustive, pascoli, prati-pascoli, incolti erbacei, coltivati

Comune Contigliano

Località Monte Rocca Alatri

Superfici	Assestamentale totale	10,3591
	produttiva	10,3070
	improduttiva	0,0521

Fattori ambientali e di gestione

Posta sul crinale-cresta ad un'altitudine prevalente di 990 metri. Esposizione prevalente a sud-est.

Pendenza prevalente del 15 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Formazione erbacea a pascolo.

Cotico misto leguminose graminacee, continuo ma rado.

Infestanti caratterizzate dalla presenza di *Cardus* spp, *Rosa* sp, *Juniperus communis*, *Rubus* sp, *Juniperus oxycedrus* rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Pascolo libero, della durata di 275 giorni; fruito da bovini ed equini, carico normale; disponibilità di acqua nulla.

Componente arborea formata da Orniello, Pino nero, Cerro, Roverella, ricoprente il 15% della superficie.

Rinnovazione assente.

Funzione principale

allevamento zootecnico, attitudine accessoria: protezione idrogeologica.

Ipotesi di intervento: decespugliamento, intervento secondario: prevenzione a.i.b. da effettuare entro 5 anni.

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 5c

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Monte Rocca Alatri - Colle San Pastore

Superfici	Assestamentale totale	24,1666
	produttiva	24,1275
	improduttiva	0,0391

Fattori ambientali e di gestione

Posta in un compluvio ad un'altitudine prevalente di 940 metri. Esposizione prevalente a sud-est.

Pendenza prevalente del 35 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Danni lievi causati da sovrapascolamento.

Fatti particolari: pascolo in bosco di bovini, sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 70% della particella insufficiente sul restante 30%.

Produttivi non boscati 3,3 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo in riproduzione di origine agamica poco vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine Acer (genere), Roverella, Orniello, Pino nero (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità scarsa, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 6 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Juniperus (genere), Rosa (genere), Rubus (genere), rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 4 cm; altezze prevalente 4 m; N° piante/ha 4000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 5d

COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion

Comune Contigliano

Località Colle di San Pastore

Superfici	Assestamentale totale	24,9236
	produttiva	24,6092
	improduttiva	0,3144

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 800 metri. Esposizione prevalente a sud-est.

Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità forte.

Dissesto molto grave imputabile a erosione superficiale - incanalata, alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di rotolamento massi; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su più del 60% della superficie, rocce affioranti su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici.

Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Roverella e in subordine Leccio, Carpinella, Acer (genere), Cerro (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune, con matricinatura insufficiente; età prevalente accertata 60 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Juniperus (genere), Ginestra odorosa, presenti su meno di due terzi della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

naturalistiche o conservative secondariamente la particella svolge anche la funzione di protezione idrogeologica poiché caratterizzata da elevate pendenze.

Orientamento selvicolturale

evoluzione naturale guidata.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 2500

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 5e

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Fosso di Belvece

Superfici	Assestamentale totale	14,9355
	produttiva	14,3718
	improduttiva	0,5637

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 790 metri. Esposizione prevalente a sud-ovest.

Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità media.

Grave dissesto dovuto a erosione superficiale - incanalata, alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di rotolamento massi; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su più del 60% della superficie, rocce affioranti su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Produttivi non boscati 1,5 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine Carpinella, Leccio, Acer (genere), Roverella (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'85% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 7 anni la particella è stata utilizzata per uso civico in diverse stagioni silvane, alcune porzioni sono tuttora in fase di utlizzazione. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Juniperus (genere), Rosa (genere), Ginestra odorosa, presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da Helleborus spp, graminacee xerofile rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale
produzione di legname.

Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento
nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 4 cm; altezze prevalente 6 m; N° piante/ha 6000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 5f

COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion

Comune Contigliano

Località Colle Aratro

Superfici	Assestamentale totale	37,5395
	produttiva	37,3683
	improduttiva	0,1712

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 650 metri. Esposizione prevalente a sud. Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità forte.

Dissesto molto grave imputabile a erosione superficiale - incanalata, alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di rotolamento massi; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su più del 60% della superficie, rocce affioranti su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 20% della particella insufficiente sul restante 80%.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero e in subordine Roverella, Orniello, Cerro, Leccio, Acer (genere), Carpinella, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO A PREVALENZA DI CARPINO NERO O CARPINO ORIENTALE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 60 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Edera, Juniperus (genere), Rovo, Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da Helleborus spp, Cyclamen spp, graminacee xerofile rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

naturalistiche o conservative la porzione a valle in corrispondenza della viabilità riveste funzione produttiva.

Orientamento selvicolturale
evoluzione naturale guidata.

Ipotesi di intervento
nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 2300

NOTE

Una porzione della particella, nei pressi del confine sud-ovest in corrispondenza della pista, è in fase di utilizzazione per uso civico.

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 6

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Monte Rotondo

Superfici	Assestamentale totale	12,2894
	produttiva	12,1860
	improduttiva	0,1034

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 1000 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza prevalente del 30 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Danni lievi causati da sovrapascolamento.

Fatti particolari: pascolo in bosco di equini, sorgenti, fonti, sottoposta a usi civici; presenti aree sosta, strade camionabili, volubro, sentieri guidati, edifici, piste forestali.

Accessibilità buona sul 90% della particella insufficiente sul restante 10%.

Produttivi non boscati 1,17 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero, Roverella, Acer (genere), Faggio, Orniello, Carpino bianco, Sorbus (genere) (Tipo: CERRETA CON ALTRE LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 38 anni. Novellame sporadico, sotto copertura (specie prevalente Cerro) rinnovazione insufficiente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname in prossimità del rifugio, la particella svolge prevalentemente una funzione turistico-ricreativa.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione, intervento secondario: avviamento da realizzare eventualmente solo in prossimità del rifugio da effettuare entro 5 anni.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 12 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 3500

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 7

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Sorgente Belvece

Superfici	Assestamentale totale	16,4980
	produttiva	16,0634
	improduttiva	0,4346

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 800 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali, strade camionabili.

Accessibilità buona sul 70% della particella insufficiente sul restante 30%.

Produttivi non boscati 0,8 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine Acer (genere), Orniello, Roverella, Castagno, Faggio, Carpino bianco, Sorbus (genere), Leccio (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 50% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 1 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Pteridium aquilinum rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

ceduazione la particella è attualmente in fase di utilizzazione

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 12 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 100 i valori si riferiscono alle matricine i valori si riferiscono alle matricine

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 8

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Monte Rotondo versante Sud

Superfici	Assestamentale totale	13,8383
	produttiva	13,6541
	improduttiva	0,1842

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 980 metri. Esposizione prevalente a sud. Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti strade camionabili, piste forestali.

Accessibilità buona sull'80% della particella insufficiente sul restante 20%.

Produttivi non boscati 1,3 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine Acer (genere), Roverella, Orniello, Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere), Castagno (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 3 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

ceduazione

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 4 cm; altezze prevalente 4 m; N° piante/ha 7000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 9a

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Monte Macchione

Superfici	Assestamentale totale	18,9060
	produttiva	18,8229
	improduttiva	0,0831

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 980 metri. Esposizione prevalente a sud. Pendenza prevalente del 40 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Produttivi non boscati 9,5 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo maturo di origine agamica poco vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine Roverella, Orniello, Acer (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità scarsa, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 25 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione da effettuare entro il periodo successivo di applicazione del piano.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 8.6 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 2000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 9b

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Monte Macchione versante Est

Superfici	Assestamentale totale	12,0855
	produttiva	11,9029
	improduttiva	0,1826

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 980 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali, strade camionabili.

Accessibilità buona sull'80% della particella insufficiente sul restante 20%.

Produttivi non boscati 1,8 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero, Acer (genere), Roverella, Orniello, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: CERRETA CON ALTRE LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune, con matricinatura eccessiva; età prevalente accertata 3 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

ceduazione

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

perseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 12 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 200 i valori si riferiscono alle matricine i valori si riferiscono alle matricine

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 9c

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Foss dei Doghettari

Superfici	Assestamentale totale	8,9783
	produttiva	8,7761
	improduttiva	0,2022

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 860 metri. Esposizione prevalente a sud-est.

Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali, strade camionabili.

Accessibilità buona sul 90% della particella insufficiente sul restante 10%.

Produttivi non boscati 0,5 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero, Acer (genere), Roverella, Orniello, Sorbus (genere) (Tipo: CERRETA CON ALTRE LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 90% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 30 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Ginestra odorosa, presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

perseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione da effettuare entro 5 anni.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 10.4 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 2850

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 10

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Trippa Nera

Superfici	Assestamentale totale	
	produttiva	6,4842
	improduttiva	6,2680
		0,2162

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 910 metri. Esposizione prevalente a sud. Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali, strade camionabili.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Produttivi non boscati 0,6 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero, Faggio e in subordine Acer (genere), Roverella, Orniello, Sorbus (genere), Carpino bianco (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 14 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 4 cm; altezze prevalente 5 m; N° piante/ha 5000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 11

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Trippa Nera - Fosso Belvece

Superfici	Assestamentale totale	11,9475
	produttiva	11,7145
	improduttiva	0,2330

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 880 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza prevalente del 60 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti strade camionabili, piste forestali.

Accessibilità buona sul 30% della particella insufficiente sul restante 70%.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine Acer (genere), Roverella, Orniello, Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere), Castagno (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 8 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 5 cm; altezze prevalente 5 m; N° piante/ha 6000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 12a

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Fosso dei Doghettari

Superfici	Assestamentale totale	8,7028
	produttiva	8,5801
	improduttiva	0,1227

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 860 metri. Esposizione prevalente a sud-ovest.

Pendenza prevalente del 60 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali, strade camionabili.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine Acer (genere), Roverella, Orniello, Sorbus (genere), Carpino bianco (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 16 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 4 cm; altezze prevalente 5 m; N° piante/ha 5000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 12b

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Campo Trocco

Superfici	Assestamentale totale	18,8526
	produttiva	18,5551
	improduttiva	0,2975

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 730 metri. Esposizione prevalente a sud-est.

Pendenza prevalente del 60 %, accidentalità debole.

Grave dissesto dovuto a erosione superficiale - incanalata, alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di rotolamento massi; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 40% della particella insufficiente sul restante 60%.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine Roverella, Acer (genere), Carpinella, Orniello, Maggiociondolo, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 15 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Edera, Ginepro comune, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da Helleborus spp, Cyclamen spp, graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 3 cm; altezze prevalente 4 m; N° piante/ha 8000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 13

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Valle Tucciolo

Superfici	Assestamentale totale	11,0966
	produttiva	10,8587
	improduttiva	0,2379

Fattori ambientali e di gestione

Posta in un dosso-displuvio ad un'altitudine prevalente di 750 metri. Esposizione prevalente ad est.

Pendenza prevalente del 65 %, accidentalità media.

Grave dissesto dovuto a erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, rocce affioranti su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo immaturo di origine agamica molto vigoroso di Castagno, Faggio e in subordine Cerro, Carpino nero, Acer (genere), Roverella, Carpino bianco, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 90% assenti vuoti e lacune, con matricinatura eccessiva; età prevalente accertata 15 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Coronilla, Agrifoglio, Ginepro comune, Rosa (genere), presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da Helleborus spp, Cyclamen spp, Daphne spp. rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 7 m; N° piante/ha 5000

NOTE

A ridosso della valletta interna, con esposizione Nord e Nord-Ovest, il popolamento è costituito da una fustaia, probabilmente di origine agamica, a prevalenza di faggio.

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 14a

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Costa Fioretti

Superfici	Assestamentale totale	
	produttiva	23,8547
	improduttiva	23,5020
		0,3527

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 710 metri. Esposizione prevalente a nord-ovest.

Pendenza prevalente del 60 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine Roverella, Orniello, Acer (genere), Carpinella, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura insufficiente; età prevalente accertata 1 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

ceduazione la particella è attualmente in fase di utilizzazione

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 9 cm; altezze prevalente 9 m; N° piante/ha 2500

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 14b

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Fosso Campo Trocco

Superfici	Assestamentale totale	10,8691
	produttiva	10,6642
	improduttiva	0,2049

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 570 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza prevalente del 65 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine Roverella, Acer (genere), Orniello, Carpinella, Sorbus (genere), Maggiociondolo (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 90% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 13 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rubus (genere), presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 4 cm; altezze prevalente 6 m; N° piante/ha 3500

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 14c

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Costa Fioretti versante Est

Superfici	Assestamentale totale	14,4824
	produttiva	14,4537
	improduttiva	0,0287

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 670 metri. Esposizione prevalente a nord-est.

Pendenza prevalente del 65 %, accidentalità debole.

Grave dissesto dovuto a erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 30% della particella insufficiente sul restante 70%.

Produttivi non boscati 1,5 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine Roverella, Orniello, Acer (genere), Carpinella, Sorbus (genere), realmente il popolamento è un ceduo invecchiato, ma poiché la particella è interessata da un progetto di taglio autorizzato dagli organi competenti è prossimo all'utilizzazione e quindi viene considerato in riproduzione; (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 50% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 1 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Rubus (genere), rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da Helleborus spp, graminacee xerofile rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

ceduazione

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 10 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 100 i valori si riferiscono alle matricine i valori si riferiscono alle matricine

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 14d

COMPRESA: Formazioni arbustive, pascoli, prati-pascoli, incolti erbacei, coltivati

Comune Contigliano

Località Fioretti

Superfici	Assestamentale totale	4,5220
	produttiva	4,5220
	improduttiva	0,0000

Fattori ambientali e di gestione

Posta sul crinale-cresta ad un'altitudine prevalente di 850 metri. Esposizione prevalente a sud-est.

Pendenza prevalente del 15 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici.

Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Formazione erbacea a pascolo.

Cotico a prevalenza di graminacee, continuo e compatto.

Infestanti caratterizzate dalla presenza di *Rosa sp*, *Juniperus communis*, *Rubus sp*, *Crataegus sp*. rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Pascolo libero, della durata di 275 giorni; fruito da bovini, carico normale; disponibilità di acqua nulla.

Componente arborea formata da *Acer* (genere), *Carpino nero*, *Cerro*, *Roverella*, ricoprente il 0% della superficie.

Funzione principale

allevamento zootecnico.

Ipotesi di intervento: decespugliamento da effettuare entro 5 anni.

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 15a

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Monte Abbruciaticcio

Superfici	Assestamentale totale	
	produttiva	5,9225
	improduttiva	5,9184
		0,0041

Fattori ambientali e di gestione

Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1010 metri. Esposizione prevalente a nord-est.

Pendenza prevalente del 45 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Produttivi non boscati 0,7 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Acer (genere), Carpino bianco, Faggio, Sorbo montano (Tipo: CERRETA CON ALTRE LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 30 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), presenti sporadicamente sulla superficie

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione da effettuare entro 5 anni.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 10.6 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 2675

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 15b

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Morra

Superfici	Assestamentale totale	
	produttiva	12,7527
	improduttiva	12,7456
		0,0071

Fattori ambientali e di gestione

Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 980 metri. Esposizione prevalente ad est.

Pendenza prevalente del 35 %, accidentalità media.

Danni gravi causati da sovrapascolamento.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Produttivi non boscati 0,8 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Acer (genere), Roverella, Carpino bianco, Carpino nero, Orniello, Faggio, Sorbo montano (Tipo: CERRETA CON ALTRE LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 15 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da Helleborus spp, graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 15 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 100 i valori si riferiscono alle matricine i valori si riferiscono alle matricine

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 16a

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Morra

Superfici	Assestamentale totale	
	produttiva	10,6067
	improduttiva	10,6067
		0,0000

Fattori ambientali e di gestione

Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 930 metri. Esposizione prevalente a sud.

Pendenza prevalente del 45 %, accidentalità media.

Possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Danni gravi causati da sovrapascolamento.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 20% della particella insufficiente sul restante 80%.

Produttivi non boscati 1 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Roverella e in subordine Carpino nero, Acer (genere), Orniello (Tipo: BOSCO MISTO DI QUERCE DECIDUE CON LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 14 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Juniperus (genere), Rosa (genere), rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 13 cm; altezze prevalente 11 m; N° piante/ha 100 i valori si riferiscono alle matricine i valori si riferiscono alle matricine

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 16b

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Fonte Cerro

Superfici	Assestamentale totale	14,5917
	produttiva	14,1575
	improduttiva	0,4342

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 830 metri. Esposizione prevalente a sud. Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sorgenti, fonti, sottoposta a usi civici; la particella ricade in parte all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili.

Accessibilità buona sul 90% della particella insufficiente sul restante 10%.

Produttivi non boscati 4,6 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo maturo di origine agamica poco vigoroso di Carpino nero, Roverella e in subordine Orniello, Acer (genere), Cerro (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità scarsa, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune, con matricinatura insufficiente; età prevalente accertata 27 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Juniperus (genere), Rosa (genere), Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione da effettuare entro il periodo successivo di applicazione del piano.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 7 m; N° piante/ha 2500

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 17

COMPRESA: Formazioni arbustive, pascoli, prati-pascoli, incolti erbacei, coltivati

Comune Contigliano

Località Capomonte

Superfici	Assestamentale totale	3,9247
	produttiva	3,8801
	improduttiva	0,0446

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 710 metri. Esposizione prevalente a sud-ovest.

Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali, strade camionabili.

Accessibilità buona sul 90% della particella insufficiente sul restante 10%.

Descrizione fisionomico-culturale

Formazione arbustiva di altezza media pari a 3 metri.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Orniello, Juniperus (genere), Carpino nero, Rosa (genere), Rubus (genere), ricoprente il 60% della superficie; quello erbaceo da Helleborus spp, graminacee xerofile rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Componente arborea formata da Acer (genere), Orniello, Carpino nero, Cerro, Roverella, ricoprente il 10% della superficie.

Rinnovazione assente.

Funzione principale

protezione idrogeologica.

Ipotesi di intervento: nessun intervento, il soprassuolo sta lentamente virando verso una struttura prettamente forestale, per questo è opportuno lasciare evolvere in modo naturale.

NOTE: Una modesta porzione della particella, pari a circa 0,35ha, caratterizzata da un popolamento ceduo, è stata oggetto di un taglio di fine turno, realizzato, molto probabilmente, in maniera abusiva.

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 18

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Colle Croce

Superfici	Assestamentale totale	13,6575
	produttiva	13,2222
	improduttiva	0,4353

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 530 metri. Esposizione prevalente a nord-est.

Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti strade camionabili.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Produttivi non boscati 1,4 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo maturo di origine agamica poco vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine Orniello, Roverella, Carpinella, Acer (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 20 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Bosso, Crataegus (genere), Juniperus (genere), Rosa (genere), Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da Helleborus spp, graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione da effettuare entro il periodo successivo di applicazione del piano.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 7 m; N° piante/ha 4000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 19

COMPRESA: Rimboschimenti di conifere

Comune Contigliano

Località Pineta dell'Impero

Superfici	Assestamentale totale	19,5513
	produttiva	18,8259
	improduttiva	0,7254

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 570 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza prevalente del 40 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti bottino acqua, piste forestali, strade camionabili.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Produttivi non boscati 3 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Fustaia monoplana adulta di origine agamica mediamente vigoroso di Pino nero e in subordine Roverella, Orniello, Carpino nero, Cerro, Terebinto, Acero minore, Carpinella, Ciliegio selvatico, Sorbo montano (Tipo: BOSCO A PREVALENZA DI PINO NERO CON LATIFOGGLIE DECIDUE) densità eccessiva, grado di copertura pari al 90% presenti vuoti e lacune; età prevalente accertata 65 anni. Novellame sporadico, sotto copertura (specie prevalente Pino nero) rinnovazione insufficiente. Strato arbustivo formato da Bosso, Rosa (genere), Rovo, Pungitopo, Laurotino, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

protezione idrogeologica.

Orientamento selvicolturale

evoluzione naturale guidata.

Ipotesi di intervento

diradamento, intervento secondario: taglio buche da effettuare entro 5 anni.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 21 cm; altezze prevalente 11 m; N° piante/ha 1100

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 20

COMPRESA: Formazioni arbustive, pascoli, prati-pascoli, incolti erbacei, coltivati

Comune Contigliano

Località Penne Fariolo

Superfici	Assestamentale totale	22,8652
	produttiva	22,3911
	improduttiva	0,4741

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 740 metri. Esposizione prevalente a sud-est.

Pendenza prevalente del 60 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di rocce affioranti, terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade in parte all'interno del S.I.C. - Z.P.S.

IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali, strade camionabili.

Accessibilità buona sull'80% della particella insufficiente sul restante 20%.

Descrizione fisionomico-culturale

Formazione arbustiva di altezza media pari a 2 metri.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Orniello, Juniperus (genere), Maggiociondolo, Carpino nero, Rosa (genere), Rovo, Ginestra odorosa, ricoprente il 60% della superficie; quello erbaceo da Helleborus spp, graminacee xerofile rappresentate su meno di un terzo della superficie. Componente arborea formata da Acer (genere), Cerro, Roverella, ricoprente il 10% della superficie.

Rinnovazione assente.

Funzione principale

protezione idrogeologica.

Ipotesi di intervento: nessun intervento, il soprassuolo sta lentamente virando verso una struttura prettamente forestale, per questo è opportuno lasciare evolvere in modo naturale.

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 21

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Monte Cimamacchia

Superfici	Assestamentale totale	9,1666
	produttiva	9,1240
	improduttiva	0,0426

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 940 metri. Esposizione prevalente ad ovest.

Pendenza prevalente del 40 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata.

Fatti particolari: pascolo in bosco di bovini, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, sentieri guidati, piste forestali.

Accessibilità buona sull'80% della particella insufficiente sul restante 20%.

Produttivi non boscati 1,1 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero, Orniello, Acer (genere), Roverella, Faggio, Carpino bianco, Sorbus (genere) (Tipo: CERRETA CON ALTRE LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 90% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; presenti matricine del triplo turno di faggio e cerro; età prevalente accertata 35 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Corniolo, Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Rovo, Ginestra odorosa, presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da Fragaria vesca, Cyclamen spp, graminacee xerofile rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione da effettuare entro 5 anni.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 10 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 4600

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 22a

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Monte Cimamacchia versante Nord

Superfici	Assestamentale totale	15,0806
	produttiva	15,0498
	improduttiva	0,0308

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 850 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Danni lievi causati da sovrapascolamento.

Fatti particolari: pascolo in bosco di bovini, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti sentieri guidati.

Accessibilità buona sul 20% della particella insufficiente sul restante 80%.

Produttivi non boscati 0,2 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine Orniello, Roverella, Acer (genere), Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 30 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Corniolo, Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Rovo, Pungitopo, presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da Fragaria vesca, Cyclamen spp, graminacee xerofile rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione da effettuare entro il periodo successivo di applicazione del piano.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 9.2 cm; altezze prevalente 9 m; N° piante/ha 4650

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 22b

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Cimamacchia

Superfici	Assestamentale totale	10,8639
	produttiva	10,6679
	improduttiva	0,1960

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 750 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Danni lievi causati da sovrapascolamento.

Fatti particolari: pascolo in bosco di bovini, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti sentieri guidati, piste forestali.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Produttivi non boscati 0,25 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine Orniello, Roverella, Acer (genere), Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 5 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Rovo, Pungitopo, Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da Fragaria vesca, Cyclamen spp, graminacee xerofile rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

ceduazione

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 12 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 100 i valori sisriferiscono alle matricine i valori sisriferiscono alle matricine

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 23a

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Valle Cericola

Superfici	Assestamentale totale	19,2796
	produttiva	19,1778
	improduttiva	0,1018

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 650 metri. Esposizione prevalente a nord-est.

Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Produttivi non boscati 0,44 ha circa.

Descrizione fisionomico-colturale

Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Roverella e in subordine Orniello, Cerro, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 30 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Juniperus (genere), Rosa (genere), Pungitopo, Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione da effettuare entro il periodo successivo di applicazione del piano.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 7 m; N° piante/ha 7000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 23b

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Monte Cimamacchia versante Nord-Est

Superfici	Assestamentale totale	23,3880
	produttiva	23,3433
	improduttiva	0,0447

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 800 metri. Esposizione prevalente a nord-est.

Pendenza prevalente del 65 %, accidentalità media.

Possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: pascolo in bosco di bovini, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti sentieri guidati.

Accessibilità buona sul 20% della particella insufficiente sul restante 80%.

Produttivi non boscati 1,15 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo maturo di origine agamica poco vigoroso di Carpino nero, Roverella e in subordine Orniello, Cerro, Acer (genere), Sorbus (genere), Leccio (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 30 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Corniolo, Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da Fragaria vesca, Cyclamen spp, graminacee xerofile rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione con rilasci di 90 matricine ad ettaro di cui un terzo di età multipla del turno da effettuare entro il periodo successivo di applicazione del piano.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 7.1 cm; altezze prevalente 7 m; N° piante/ha 7425

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 23c

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Capo le Vigne

Superfici	Assestamentale totale	15,2492
	produttiva	15,0686
	improduttiva	0,1806

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 630 metri. Esposizione prevalente a nord-est.

Pendenza prevalente del 60 %, accidentalità media.

Grave dissesto dovuto a erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Produttivi non boscati 3,02 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo maturo di origine agamica poco vigoroso di Carpino nero, Roverella e in subordine Orniello, Cerro, Acer (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, scarsa a tratti, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 30 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Juniperus (genere), Rosa (genere), Pungitopo, Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione da effettuare entro il periodo successivo di applicazione del piano.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 7 m; N° piante/ha 6000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 24

COMPRESA: Formazioni arbustive, pascoli, prati-pascoli, incolti erbacei, coltivati

Comune Contigliano

Località Monte Cimamacchia

Superfici	Assestamentale totale	18,9267
	produttiva	18,8479
	improduttiva	0,0788

Fattori ambientali e di gestione

Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 960 metri. Esposizione prevalente a sud-est.

Pendenza prevalente del 15 %, accidentalità debole.

Possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, piazzali-buche di carico, piste forestali.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Formazione erbacea a pascolo.

Cotico a prevalenza di graminacee, continuo e compatto.

Infestanti caratterizzate dalla presenza di *Cardus* spp, *Rosa* sp, *Juniperus communis*, *Rubus* sp, *Spartium junceum*, *Juniperus oxycedrus* rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Pascolo libero, della durata di 275 giorni; fruito da bovini, ovini ed equini, carico normale; disponibilità di acqua nulla.

Componente arborea formata da *Acer* (genere), Melo selvatico, Cerro, Roverella, ricoprente il 5% della superficie.

Rinnovazione assente.

Funzione principale

allevamento zootecnico.

Ipotesi di intervento: decespugliamento da effettuare entro 5 anni.

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 25

COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion

Comune Contigliano

Località San Tomeo

Superfici	Assestamentale totale	30,6117
	produttiva	30,1972
	improduttiva	0,4145

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 800 metri. Esposizione prevalente a sud. Pendenza prevalente del 75 %, accidentalità molto forte.

Grave dissesto dovuto a erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su più del 60% della superficie.

Fatti particolari: emergenze storico-naturalistiche, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili. Accessibilità buona sul 20% della particella insufficiente sul restante 80%.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica poco vigoroso di Carpino nero, Orniello e in subordine Roverella, Leccio, Acer (genere) (Tipo: BOSCO A PREVALENZA DI CARPINO NERO O CARPIN ORIENTALE CON ALTRE LATIFOLIE DECIDUE) densità scarsa, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune, con matricinatura insufficiente; età prevalente accertata 60 anni, valore indicativo poiché non si hanno notizie storiche di interventi. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Juniperus (genere), Rosa (genere), Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

naturalistiche o conservative nei pressi della chiesa di San Tomeo la funzione prevalente è turistico-ricreativa, mentre dove le pendenze aumentano la particella svolge anche la funzione di protezione idrogeologica.

Orientamento selvicolturale
evoluzione naturale guidata.

Ipotesi di intervento
nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 7 m; N° piante/ha 2000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 26a

COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion

Comune Contigliano

Località Grotta Celluca

Superfici	Assestamentale totale	30,7427
	produttiva	30,3045
	improduttiva	0,4382

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 650 metri. Esposizione prevalente a sud-est.

Pendenza prevalente dell'80 %, accidentalità molto forte.

Grave dissesto dovuto a erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su più del 60% della superficie.

Fatti particolari: emergenze storico-naturalistiche, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno

del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti sentieri guidati.

Accessibilità buona sul 20% della particella insufficiente sul restante 80%.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica poco vigoroso di Carpino nero, Orniello e in subordine Roverella, Leccio, Acer (genere) (Tipo: BOSCO A PREVALENZA DI CARPINO NERO O CARPIN ORIENTALE CON ALTRE LATIFOLIE DECIDUE) densità scarsa, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune, con matricinatura insufficiente; età prevalente accertata 60 anni, valore indicativo poiché non si hanno notizie storiche di interventi. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Juniperus (genere), Rosa (genere), Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

naturalistiche o conservative secondariamente la particella svolge anche la funzione di protezione idrogeologica poiché caratterizzata da elevate pendenze.

Orientamento selvicolturale

evoluzione naturale guidata.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 7 m; N° piante/ha 2000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 26b

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Campo Morrone

Superfici	Assestamentale totale	17,0937
	produttiva	16,9880
	improduttiva	0,1057

Fattori ambientali e di gestione

Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 830 metri. Esposizione prevalente a sud-est.

Pendenza prevalente del 40 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata.

Danni lievi causati da sovrapascolamento.

Fatti particolari: pascolo in bosco di bovini, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, piste forestali.

Accessibilità buona sull'80% della particella insufficiente sul restante 20%.

Produttivi non boscati 2 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine Roverella, Orniello, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 30 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Corniolo, Crataegus (genere), Juniperus (genere), Rosa (genere), presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da Fragaria vesca, Cyclamen spp, graminacee xerofile rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione con rilascio di 90 matricine ad ettaro di cui un terzo di età doppia del turno da effettuare entro 6-10 anni.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 4850

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 27

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Colle d'Oro

Superfici	Assestamentale totale	8,1284
	produttiva	8,1280
	improduttiva	0,0004

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 510 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali, strade camionabili.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Roverella, Cerro e in subordine Carpino nero, Orniello, Acer (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI QUERCE DECIDUE CON LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 19 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Pungitopo, Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 15 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 100 i valori si riferiscono alle matricine i valori si riferiscono alle matricine

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 28

COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion

Comune Contigliano

Località Valle Tasso

Superfici	Assestamentale totale	13,0435
	produttiva	12,8871
	improduttiva	0,1564

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 990 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza prevalente del 75 %, accidentalità molto forte.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di rocce affioranti, terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto.

Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica poco vigoroso di Carpino nero, Orniello, Roverella e in subordine Cerro, Acer (genere), Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura assente; età prevalente accertata 50 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Juniperus (genere), Rosa (genere), Pungitopo, Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da Fragaria vesca, Cyclamen spp, graminacee xerofile rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

naturalistiche o conservative secondariamente la particella svolge anche la funzione di protezione idrogeologica poiché caratterizzata da elevate pendenze.

Orientamento selvicolturale

evoluzione naturale incontrollata.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 2000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 29

COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion

Comune Contigliano

Località Grotta dell'Orso

Superfici	Assestamentale totale	22,7295
	produttiva	22,4562
	improduttiva	0,2733

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 880 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza prevalente del 75 %, accidentalità molto forte.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di rocce affioranti, terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto.

Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica poco vigoroso di Carpino nero, Orniello, Roverella e in subordine Cerro, Acer (genere), Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura assente; età prevalente accertata 50 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Juniperus (genere), Rosa (genere), Pungitopo, Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da Fragaria vesca, Cyclamen spp, graminacee xerofile rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

naturalistiche o conservative secondariamente la particella svolge anche la funzione di protezione idrogeologica poiché caratterizzata da elevate pendenze.

Orientamento selvicolturale

evoluzione naturale incontrollata.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 2000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 30a

COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion

Comune Contigliano

Località Valle Cupa

Superfici	Assestamentale totale	7,7256
	produttiva	7,5647
	improduttiva	0,1609

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 800 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza prevalente del 70 %, accidentalità forte.

Grave dissesto dovuto a erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di rocce affioranti, terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto.

Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Orniello e in subordine Acer (genere), Cerro, Roverella, Faggio, Leccio (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità scarsa, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura insufficiente; età prevalente accertata 50 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Pungitopo, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

naturalistiche o conservative secondariamente, date le elevate pendenze, la particella svolge anche la funzione di protezione idrogeologica.

Orientamento selvicolturale

evoluzione naturale guidata.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 9 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 2000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 30b

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Valle Cupa - Fosso Ravi

Superfici	Assestamentale totale	7,4147
	produttiva	7,3561
	improduttiva	0,0586

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 900 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero, Acer (genere), Roverella, Orniello, Faggio (Tipo: CERRETA CON ALTRE LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 90% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 30 anni. Novellame sporadico, sotto copertura (specie prevalente Cerro) rinnovazione insufficiente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione da effettuare entro 5 anni.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 10.2 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 3080

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 31

COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion

Comune Contigliano

Località La Lanna

Superfici	Assestamentale totale	25,0732
	produttiva	24,7019
	improduttiva	0,3713

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 800 metri. Esposizione prevalente a nord-ovest.

Pendenza prevalente del 75 %, accidentalità forte.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto.

Accessibilità buona sul 20% della particella insufficiente sul restante 80%.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica poco vigoroso di Carpino nero, Orniello e in subordine Roverella, Acer (genere), Cerro, Faggio, Leccio (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura insufficiente; età prevalente accertata 50 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Pungitopo, presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

naturalistiche o conservative secondariamente la particella svolge anche la funzione di protezione idrogeologica poiché caratterizzata da elevate pendenze.

Orientamento selvicolturale

evoluzione naturale guidata.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 7 m; N° piante/ha 5000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 32a

COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion

Comune Contigliano

Località Poggiolo

Superfici	Assestamentale totale	9,4259
	produttiva	9,4253
	improduttiva	0,0006

Fattori ambientali e di gestione

Posta in basso versante ad un'altitudine prevalente di 650 metri. Esposizione prevalente a nord.

Pendenza prevalente del 90 %, accidentalità molto forte.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su più del 60% della superficie, pietrosità, rocce affioranti su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto.

Accessibilità buona sul 20% della particella insufficiente sul restante 80%.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica poco vigoroso di Carpino nero e in subordine Orniello, Cerro, Roverella, Acer (genere), Faggio, Leccio (Tipo: ORNO-OSTRIETO) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura insufficiente; età prevalente accertata 50 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Pungitopo, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

naturalistiche o conservative secondariamente la particella svolge anche la funzione di protezione idrogeologica poiché caratterizzata da elevate pendenze.

Orientamento selvicolturale

evoluzione naturale guidata.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 7 m; N° piante/ha 3500

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 32b

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Cognolo

Superfici	Assestamentale totale	5,9343
	produttiva	5,6922
	improduttiva	0,2421

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 690 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza prevalente del 35 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Produttivi non boscati 0,7 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero e in subordine Orniello, Roverella, Acer (genere), Cerro (Tipo: BOSCO A PREVALENZA DI CARPINO NERO O CARPINO ORIENTALE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 40 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Pungitopo, presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione da effettuare entro 6-10 anni.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 5000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 33a

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Piantanato

Superfici	Assestamentale totale	21,6025
	produttiva	21,3130
	improduttiva	0,2895

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 750 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza prevalente del 55 %,

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 5000.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti tracciati per mezzi agricoli minori, piazzali-buche di carico, piste forestali, strade camionabili.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Produttivi non boscati 1,16 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine Acer (genere), Roverella, Orniello, Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 30 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Ginepro comune, presente sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione da effettuare entro 6-10 anni.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 4500

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 33b

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Bandita

Superfici	Assestamentale totale	20,4366
	produttiva	20,4206
	improduttiva	0,0160

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 950 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade in parte all'interno del S.I.C. - Z.P.S.

IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti tracciati per mezzi agricoli minori, strade camionabili, piste forestali.

Accessibilità buona sul 30% della particella insufficiente sul restante 70%.

Produttivi non boscati 1,05 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine Acer (genere), Roverella, Orniello, Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 30 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Ginepro comune, presente sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione da effettuare entro 5 anni.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 4900

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 34a

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Fonte Pidocchiosa

Superfici	Assestamentale totale	
	produttiva	10,8098
	improduttiva	10,7003
		0,1095

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 970 metri. Esposizione prevalente a sud-ovest.

Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità su meno del 30% della superficie.

Danni lievi causati da sovrapascolamento.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, elettrodotti, muri - recinzioni, piste forestali.

Accessibilità buona sul 70% della particella insufficiente sul restante 30%.

Produttivi non boscati 4 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica poco vigoroso di Roverella e in subordine Carpino nero, Cerro, Acer (genere), Orniello (Tipo: BOSCO MISTO DI QUERCE DECIDUE CON LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura insufficiente; età prevalente accertata 40 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Juniperus (genere), Rosa (genere), Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione da effettuare entro 6-10 anni.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 9.7 cm; altezze prevalente 9 m; N° piante/ha 4000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 34b

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località La Bandita versante Sud

Superfici	Assestamentale totale	8,8788
	produttiva	8,8085
	improduttiva	0,0703

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 920 metri. Esposizione prevalente a sud. Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, piste forestali.

Accessibilità buona sul 70% della particella insufficiente sul restante 30%.

Produttivi non boscati 1,5 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero e in subordine Roverella, Orniello, Cerro, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO A PREVALENZA DI CARPINO NERO O CARPIN ORIENTALE CON ALTRE LATIFOLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 10 anni.

Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Ginepro comune, Rovo, presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 5 cm; altezze prevalente 5 m; N° piante/ha 7000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 34c

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località La Bandita versante Est

Superfici	Assestamentale totale	15,5222
	produttiva	15,3785
	improduttiva	0,1437

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 900 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 70% della particella insufficiente sul restante 30%.

Produttivi non boscati 0,3 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo maturo (il popolamento viene definito maturo solo da un punto di vista normativo poiché il ridotto strato attivo ne limita lo sviluppo) di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero e in subordine Roverella, Cerro, Orniello, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO A PREVELENZA DI CARPINO NERO O CARPIN ORIENTALE CON ALTRE LATIFOLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 18 anni, valore medio poiché il popolamento è stato utilizzato in più stagioni silvane probabilmente per uso civico. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Pungitopo, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 7 m; N° piante/ha 5000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 35a

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Colle Termine

Superfici	Assestamentale totale	19,5734
	produttiva	19,3675
	improduttiva	0,2059

Fattori ambientali e di gestione

Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 960 metri. Esposizione prevalente a nord.

Pendenza prevalente del 40 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, muri - recinzioni, piste forestali.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Produttivi non boscati 1,2 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Roverella e in subordine Carpino nero, Carpino bianco, Acer (genere), Orniello, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI QUERCE DECIDUE CON LATIFOGGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 90% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 37 anni. Novellame sporadico, sotto copertura (specie prevalente Cerro) rinnovazione insufficiente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da Lilium bulbiferum, graminacee xerofile rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione da effettuare entro 5 anni.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 10.2 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 3080

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 35b

COMPRESA: Formazioni arbustive, pascoli, prati-pascoli, incolti erbacei, coltivati

Comune Contigliano

Località Cima Bandita

Superfici	Assestamentale totale	11,3292
	produttiva	11,2773
	improduttiva	0,0519

Fattori ambientali e di gestione

Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 980 metri. Esposizione prevalente a sud-est.

Pendenza prevalente del 35 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Formazione erbacea a pascolo.

Cotico misto leguminose graminacee, continuo e compatto.

Infestanti caratterizzate dalla presenza di *Cardus* spp, *Juniperus communis* rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Pascolo libero, della durata di 275 giorni; fruito da bovini, ovini ed equini, carico normale; disponibilità di acqua nulla.

Componente arborea formata da *Acer* (genere), *Cerro*, *Roverella*, ricoprente il 0% della superficie.

Rinnovazione insufficiente composta da *Cerro*.

Funzione principale

allevamento zootecnico.

Ipotesi di intervento: decespugliamento da effettuare entro 5 anni.

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 36a

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Fosso Piè di Monte

Superfici	Assestamentale totale	
	produttiva	14,4462
	improduttiva	14,3074
		0,1388

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 800 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Produttivi non boscati 1,6 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Roverella e in subordine Carpino nero, Orniello, Acer (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI QUERCE DECIDUE CON LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 25 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Ginepro comune, presente sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione da effettuare entro il periodo successivo di applicazione del piano.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 7 m; N° piante/ha 5400

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 36b

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Pié di Monte

Superfici	Assestamentale totale	5,9621
	produttiva	5,8055
	improduttiva	0,1566

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 750 metri. Esposizione prevalente a sud-est.

Pendenza prevalente del 65 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero e in subordine Cerro, Orniello, Roverella, Acer (genere) (Tipo: BOSCO A PREVELENZA DI CARPINO NERO O CARPIN ORIENTALE CON ALTRE LATIFOLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 20 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 7 m; N° piante/ha 5000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 36c

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Piantanato versante Est

Superfici	Assestamentale totale	
	produttiva	10,3797
	improduttiva	10,2672
		0,1125

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 700 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza prevalente del 65 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero e in subordine Cerro, Orniello, Roverella, Acer (genere) (Tipo: BOSCO A PREVALENZA DI CARPINO NERO O CARPIN ORIENTALE CON ALTRE LATIFOLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 15 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 6 cm; altezze prevalente 6 m; N° piante/ha 7000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 37a

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località La Bandita - Colle Camici

Superfici	Assestamentale totale	6,3978
	produttiva	6,3186
	improduttiva	0,0792

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 850 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza prevalente del 40 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 70% della particella insufficiente sul restante 30%.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine Orniello, Roverella, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 11 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 4 cm; altezze prevalente 5 m; N° piante/ha 5000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 37b

COMPRESA: Formazioni arbustive, pascoli, prati-pascoli, incolti erbacei, coltivati

Comune Contigliano

Località Colle Camici

Superfici	Assestamentale totale	16,2448
	produttiva	16,1343
	improduttiva	0,1105

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 690 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità debole.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, piste forestali.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Formazione arbustiva di altezza media pari a 3 metri.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Ginestra odorosa, ricoprente il 60% della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Componente arborea formata da Orniello, Carpino nero, Roverella, ricoprente il 10% della superficie.

Rinnovazione assente.

Funzione principale

protezione idrogeologica.

Ipotesi di intervento: nessun intervento, la particella è in progressiva fase di colonizzazione da parte delle specie arboree, per questo non si prevedono interventi al fine di far evolvere naturalmente il soprassuolo.

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 38

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Sorgente Vedica

Superfici	Assestamentale totale	12,6957
	produttiva	12,5952
	improduttiva	0,1005

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 810 metri. Esposizione prevalente a sud. Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, piste forestali.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Produttivi non boscati 2 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine Orniello, Roverella, Acer (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 23 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento, il popolamento viene definito maturo solo da un punto di vista normativo in quanto ha superato 16 anni, tuttavia il popolamento non è ancora pronto per il taglio di fine turno.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 6 cm; altezze prevalente 5 m; N° piante/ha 5000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 39

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Monte Romano

Superfici	Assestamentale totale	7,1972
	produttiva	7,1945
	improduttiva	0,0027

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 800 metri. Esposizione prevalente a sud. Pendenza prevalente del 45 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, piste forestali.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Produttivi non boscati 4,26 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine Roverella, Orniello, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura insufficiente; età prevalente accertata 35 anni, una piccola porzione, inferiore a 0,5ha, è stata ceduata circa 25 anni fa. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione da effettuare entro il periodo successivo di applicazione del piano.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 9 cm; altezze prevalente 9 m; N° piante/ha 2500

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 40

COMPRESA: Fustaie a prevalenza di cerro

Comune Contigliano

Località Colle Creta

Superfici	Assestamentale totale	17,0459
	produttiva	16,7675
	improduttiva	0,2784

Fattori ambientali e di gestione

Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1000 metri. Esposizione prevalente a sud.

Pendenza prevalente del 35 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata, frane superficiali; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: pascolo in bosco di ovini, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, piste forestali.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Produttivi non boscati 7,3 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Fustaia monoplana adulta di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero, Roverella, Faggio, Acer (genere), Orniello, Carpino bianco, Sorbus (genere) (Tipo: CERRETA CON ALTRE LATIFOGIE DECIDUE) densità scarsa, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune; età prevalente accertata 75 anni. Novellame sporadico, sotto copertura (specie prevalente Cerro) rinnovazione insufficiente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

ricreative-scientifiche-didattiche.

Orientamento selvicolturale

governo ad alto fusto con un'unica classe di età prevalente.

Ipotesi di intervento

nessun intervento nei nuclei di ceduo invecchiato.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 24.8 cm; altezze prevalente 16 m; N° piante/ha 940

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 41a

COMPRESA: Fustaie a prevalenza di cerro

Comune Contigliano

Località Fonte Creta

Superfici	Assestamentale totale	11,0304
	produttiva	10,8998
	improduttiva	0,1306

Fattori ambientali e di gestione

Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1030 metri. Esposizione prevalente ad est.

Pendenza prevalente del 35 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata, frane superficiali; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, piste forestali, strade camionabili.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Produttivi non boscati 4,4 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Fustaia monoplana adulta di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero, Roverella, Acer (genere), Carpino bianco, Sorbus (genere), Orniello, Faggio (Tipo: CERRETA CON ALTRE LATIFOGIE DECIDUE) densità scarsa, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune; età prevalente accertata 75 anni. Novellame sporadico, sotto copertura (specie prevalente Cerro) rinnovazione insufficiente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

ricreative-scientifiche-didattiche.

Orientamento selvicolturale

governo ad alto fusto con un'unica classe di età prevalente.

Ipotesi di intervento

nessun intervento nei nuclei di ceduo invecchiato.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 25 cm; altezze prevalente 15 m; N° piante/ha 1000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 41b

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Fosso dell'Acera

Superfici	Assestamentale totale	16,4340
	produttiva	16,1022
	improduttiva	0,3318

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 950 metri. Esposizione prevalente a sud. Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, piste forestali.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Produttivi non boscati 1,8 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine Orniello, Acer (genere), Roverella, Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 27 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione da effettuare entro 6-10 anni.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 11.6 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 1875

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 42

COMPRESA: Fustaie a prevalenza di cerro

Comune Contigliano

Località Fonte Piè di Vigne

Superfici	Assestamentale totale	35,5507
	produttiva	35,1875
	improduttiva	0,3632

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 820 metri. Esposizione prevalente a sud-ovest.

Pendenza prevalente del 70 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: pascolo in bosco di equini, sorgenti, fonti, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, piste forestali.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Produttivi non boscati 4 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Fustaia monoplana adulta originata per disseminazione naturale mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Acer (genere), Roverella, Faggio (Tipo: CERRETA) densità adeguata, scarsa a tratti; grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune; età prevalente accertata 80 anni. Novellame sporadico, sotto copertura (specie prevalente Cerro) rinnovazione insufficiente.

Interventi recenti

Funzione principale

naturalistiche o conservative.

Orientamento selvicolturale

governo ad alto fusto con un'unica classe di età prevalente.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 25 cm; altezze prevalente 18 m; N° piante/ha 1000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 43

COMPRESA: Formazioni arbustive, pascoli, prati-pascoli, incolti erbacei, coltivati

Comune Contigliano

Località Monte Macchia Cerro

Superfici	Assestamentale totale	11,6235
	produttiva	11,5855
	improduttiva	0,0380

Fattori ambientali e di gestione

Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1040 metri. Esposizione prevalente ad est.

Pendenza prevalente del 10 %, accidentalità debole.

Possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.

Accessibilità buona sull'80% della particella insufficiente sul restante 20%.

Descrizione fisionomico-culturale

Formazione erbacea a pascolo.

Cotico misto leguminose graminacee, continuo e compatto.

Infestanti caratterizzate dalla presenza di *Cardus* spp, *Juniperus communis*, *Crataegus* sp. rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Pascolo libero, della durata di 275 giorni; fruito da bovini, carico normale; disponibilità di acqua nulla.

Componente arborea formata da *Acer* (genere), Faggio, Cerro, ricoprente il 5% della superficie.

Rinnovazione insufficiente composta da Cerro.

Funzione principale

allevamento zootecnico.

Ipotesi di intervento: decespugliamento.

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 44

COMPRESA: Fustaie a prevalenza di cerro

Comune Contigliano

Località Fosso di Fonte Pidocchiosa

Superfici	Assestamentale totale	30,1172
	produttiva	30,0136
	improduttiva	0,1036

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 950 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza prevalente del 35 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di rotolamento massi; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Danni lievi causati da sovrapascolamento.

Fatti particolari: pascolo in bosco di ovini, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti aree sosta, elettrodotti, strade camionabili.

Accessibilità buona sul 25% della particella insufficiente sul restante 75%.

Produttivi non boscati 7,0036 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Fustaia monoplana adulta di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Roverella, Carpino nero, Acer (genere), Orniello, Faggio (Tipo: CERRETA) densità adeguata, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune; età prevalente accertata 70 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da Daphne spp, Hedera hedelis, graminacee xerofile rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

governo ad alto fusto con un'unica classe di età prevalente.

Ipotesi di intervento

nessun intervento nei nuclei di ceduo invecchiato.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 18 cm; altezze prevalente 15 m; N° piante/ha 1500

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 45

COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion

Comune Contigliano

Località Monte Macchia Cerro versante Est

Superfici	Assestamentale totale	6,9411
	produttiva	6,8888
	improduttiva	0,0523

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 860 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza prevalente del 70 %, accidentalità forte.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: pascolo in bosco di ovini, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto.

Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica poco vigoroso di Roverella, Carpino nero e in subordine Cerro, Orniello, Acer (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità scarsa, grado di copertura pari al 60% presenti vuoti e lacune, con matricinatura insufficiente; età prevalente accertata 65 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

naturalistiche o conservative secondariamente la particella svolge anche la funzione di protezione idrogeologica poiché caratterizzata da elevate pendenze.

Orientamento selvicolturale

evoluzione naturale incontrollata.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 10 cm; altezze prevalente 6 m; N° piante/ha 1000

NOTE

All'interno della particella sono presenti piante di notevole dimensione in avanzato stato di deperimento.

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 46

COMPRESA: Formazioni arbustive, pascoli, prati-pascoli, incolti erbacei, coltivati

Comune Contigliano

Località Grotta Sant'Angelo

Superfici	Assestamentale totale	59,1944
	produttiva	58,6643
	improduttiva	0,5301

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 650 metri. Esposizione prevalente a sud-est.

Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità forte.

Grave dissesto dovuto a erosione superficiale - incanalata, alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di frane superficiali; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto.

Accessibilità buona sul 5% della particella insufficiente sul restante 95%.

Descrizione fisionomico-culturale

Formazione arbustiva di altezza media pari a 3 metri.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Orniello, Ginepro comune, Carpino nero, Rosa (genere), ricoprente il 70% della superficie; quello erbaceo da Helleborus spp, graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Componente arborea formata da Acer (genere), Orniello, Carpino nero, Leccio, Roverella, ricoprente il 10% della superficie.

Rinnovazione assente.

Funzione principale

protezione idrogeologica.

Ipotesi di intervento: nessun intervento.

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 47

COMPRESA: Formazioni arbustive, pascoli, prati-pascoli, incolti erbacei, coltivati

Comune Contigliano

Località Fonte Pidocchiosa

Superfici	Assestamentale totale	32,2228
	produttiva	31,7409
	improduttiva	0,4819

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 750 metri. Esposizione prevalente a sud-ovest.

Pendenza prevalente dell'80 %, accidentalità forte.

Grave dissesto dovuto a erosione superficiale - incanalata, alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di frane superficiali; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto.

Accessibilità buona sul 5% della particella insufficiente sul restante 95%.

Descrizione fisionomico-culturale

Formazione arbustiva di altezza media pari a 3 metri.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Orniello, Ginepro comune, Carpino nero, Rosa (genere), ricoprente il 70% della superficie; quello erbaceo da Helleborus spp, graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Componente arborea formata da Acer (genere), Orniello, Carpino nero, Leccio, Roverella, ricoprente il 10% della superficie.

Rinnovazione assente.

Funzione principale

protezione idrogeologica.

Ipotesi di intervento: nessun intervento.

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 48

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Fosso Cagnolo

Superfici	Assestamentale totale	
	produttiva	10,1768
	improduttiva	10,0017
		0,1751

Fattori ambientali e di gestione

Posta in un compluvio ad un'altitudine prevalente di 700 metri. Esposizione prevalente a sud-est.

Pendenza prevalente del 60 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti gradonamenti.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50% attraverso una pista che transita per un fondo privato.

Produttivi non boscati 1,9 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Roverella e in subordine Orniello, Cerro, Carpino nero, Acer (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI QUERCE DECIDUE CON LATIFOGIE DECIDUE) densità scarsa, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 40 anni. Novellame sporadico, sotto copertura (specie prevalente Orniello) rinnovazione insufficiente.

Strato arbustivo formato da Asparago pungente, Crataegus (genere), Ginepro comune, Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione da effettuare entro il periodo successivo di applicazione del piano.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 10.7 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 3000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 49

COMPRESA: Formazioni arbustive, pascoli, prati-pascoli, incolti erbacei, coltivati

Comune Contigliano

Località Pozzaneve

Superfici	Assestamentale totale	
	produttiva	4,9087
	improduttiva	4,9046
		0,0041

Fattori ambientali e di gestione

Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1160 metri. Esposizione prevalente ad est.

Pendenza prevalente del 20 %, accidentalità debole.

Possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Formazione erbacea a pascolo.

Cotico misto leguminose graminacee, continuo e compatto.

Infestanti caratterizzate dalla presenza di *Cardus* spp, *Juniperus communis*, *Crataegus* sp. rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Pascolo libero, della durata di 275 giorni; fruito da bovini, carico normale; disponibilità di acqua nulla.

Componente arborea formata da *Acer campestre*, *Cerro*, ricoprente il 5% della superficie.

Rinnovazione assente.

Funzione principale

allevamento zootecnico.

Ipotesi di intervento: decespugliamento da effettuare entro 5 anni.

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 50

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Macchia Porrara

Superfici	Assestamentale totale	
	produttiva	14,4839
	improduttiva	14,4836
		0,0003

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 1050 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: pascolo in bosco di equini, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, piste forestali.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Produttivi non boscati 1,7 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero e in subordine Cerro, Acero opalo, Roverella, Orniello, Carpino bianco (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 25 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Ginepro comune, rappresentato su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione con rilascio di 90 matricine ad ettaro di cui un terzo di età doppia del turno da effettuare entro 6-10 anni.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 5000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 51

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Macchia Porrara - Fosso dell'Acera

Superfici	Assestamentale totale	12,7509
	produttiva	12,6931
	improduttiva	0,0578

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 1000 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza prevalente del 60 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, muri - recinzioni, piste forestali.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Produttivi non boscati 0,7 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero, Orniello, Roverella, Acero opalo, Carpino bianco, Faggio (Tipo: CERRETA CON ALTRE LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 60% presenti vuoti e lacune, con matricinatura eccessiva; età prevalente accertata 3 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Ginepro comune, presente sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da Daphne spp, graminacee xerofile rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

ceduazione

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 12 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 150 i valori si riferiscono alle matricine i valori si riferiscono alle matricine

NOTE

Lungo il fosso che delimita il confine con la particella 52 è stata esclusa dall'intervento una fascia dell'ampiezza di circa 20-30 metri.

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 52

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Costa Sant'Angelo

Superfici	Assestamentale totale	16,5403
	produttiva	16,5403
	improduttiva	0,0000

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 900 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, muri - recinzioni, piste forestali.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Produttivi non boscati 0,5 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero, Orniello, Roverella, Acero opalo, Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: CERRETA CON ALTRE LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 60% presenti vuoti e lacune, con matricinatura eccessiva; età prevalente accertata 3 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Ginepro comune, presente sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da Daphne spp, graminacee xerofile rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

ceduazione

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 12 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 150 i valori si riferiscono alle matricine i valori si riferiscono alle matricine

NOTE

Lungo il fosso che delimita il confine con la particella 51 è stata esclusa dall'intervento una fascia dell'ampiezza di circa 20-30 metri.

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 53a

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Macchia Porrara - Pinella

Superfici	Assestamentale totale	16,3476
	produttiva	16,3424
	improduttiva	0,0052

Fattori ambientali e di gestione

Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1100 metri. Esposizione prevalente ad est.

Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: pascolo in bosco di equini, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, piste forestali.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Produttivi non boscati 1,5 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine Acer (genere), Orniello, Roverella, Faggio, Sorbo montano, Carpino bianco (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 30 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione da effettuare entro 5 anni.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 9 cm; altezze prevalente 9 m; N° piante/ha 5000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 53b

COMPRESA: Formazioni arbustive, pascoli, prati-pascoli, incolti erbacei, coltivati

Comune Contigliano

Località Monte Porco Morto

Superfici	Assestamentale totale	6,3452
	produttiva	6,3366
	improduttiva	0,0086

Fattori ambientali e di gestione

Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1190 metri. Esposizione prevalente ad est.

Pendenza prevalente del 30 %, accidentalità media.

Possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto.

Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Formazione erbacea a pascolo.

Cotico misto leguminose graminacee, continuo e compatto.

Infestanti caratterizzate dalla presenza di *Cardus* spp, *Juniperus communis*, *Crataegus* sp. rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Pascolo libero, della durata di 275 giorni; fruito da bovini, carico normale; disponibilità di acqua nulla.

Componente arborea formata da *Acer campestre*, *Cerro*, ricoprente il 5% della superficie.

Rinnovazione assente.

Funzione principale

allevamento zootecnico.

Ipotesi di intervento: decespugliamento.

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 53c

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Monte Porsco Morto

Superfici	Assestamentale totale	13,8164
	produttiva	13,8156
	improduttiva	0,0008

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 1150 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: pascolo in bosco di equini, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili.

Accessibilità buona sul 60% della particella insufficiente sul restante 40%.

Produttivi non boscati 1,13 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine Acero opalo, Roverella, Orniello, Carpino bianco (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 25 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Ginepro comune, rappresentato su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione con rilascio di 90 matricine ad ettaro di cui un terzo di età doppia del turno da effettuare entro 6-10 anni.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 9 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 4900

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 54

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Fonte Peschiolo

Superfici	Assestamentale totale	14,1999
	produttiva	14,1607
	improduttiva	0,0392

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 950 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, piste forestali.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Produttivi non boscati 0,8 ha circa.

Descrizione fisionomico-colturale

Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero, Orniello, Roverella, Acero opalo, Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: CERRETA CON ALTRE LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 60% presenti vuoti e lacune, con matricinatura eccessiva; età prevalente accertata 3 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Ginepro comune, presente sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da Daphne spp, graminacee xerofile rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

ceduazione

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 12 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 150 i valori si riferiscono alle matricine i valori si riferiscono alle matricine

NOTE

Lungo il fosso che delimita il confine con le particella 56 a e b è stata esclusa dall'intervento una fascia dell'ampiezza di circa 20-30 metri.

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 55

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Fonte San Martino

Superfici	Assestamentale totale	13,7137
	produttiva	13,4614
	improduttiva	0,2523

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 850 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, piste forestali.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Produttivi non boscati 1,4 ha circa.

Descrizione fisionomico-colturale

Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero, Orniello, Roverella, Acero opalo, Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: CERRETA CON ALTRE LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 60% presenti vuoti e lacune, con matricinatura eccessiva; età prevalente accertata 2 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Ginepro comune, presente sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da Daphne spp, graminacee xerofile rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

ceduazione

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 12 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 150 i valori si riferiscono alle matricine i valori si riferiscono alle matricine

NOTE

Lungo il fosso che delimita il confine con la particella 56a è stata esclusa dall'intervento una fascia dell'ampiezza di circa 20-30 metri.

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 56a

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Peschiolo

Superfici	Assestamentale totale	
	produttiva	17,9395
	improduttiva	17,8567
		0,0828

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 900 metri. Esposizione prevalente a nord-est.

Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, rocce affioranti su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sorgenti, fonti, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S.

IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine

Orniello, Roverella, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE

DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 90% presenti vuoti e lacune, con

matricinatura regolare; età prevalente accertata 40 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Corniolo, Ginepro comune, Maggiociondolo, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione la particella è interessata da un progetto di taglio di fine turno del ceduo approvato dagli organi competenti e quindi prossimo all'utilizzazione da effettuare immediatamente.

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 56b

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Cimamonte

Superfici	Assestamentale totale	
	produttiva	15,3211
	improduttiva	15,1690
		0,1521

Fattori ambientali e di gestione

Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1020 metri. Esposizione prevalente a nord-est.

Pendenza prevalente del 45 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Produttivi non boscati 2,6 ha circa.

Descrizione fisionomico-colturale

Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine Orniello, Roverella, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 60% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 5 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

ceduazione

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 12 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 100 i valori si riferiscono alle matricine i valori si riferiscono alle matricine

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 57

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Colle Ladroni

Superfici	Assestamentale totale	10,6695
	produttiva	10,6209
	improduttiva	0,0486

Fattori ambientali e di gestione

Posta in un dosso-displuvio ad un'altitudine prevalente di 900 metri. Esposizione prevalente a nord.

Pendenza prevalente del 65 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, rocce affioranti su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine Orniello, Roverella, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 90% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 40 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Corniolo, Nocciolo, Ginepro comune, Maggiociondolo, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione la particella è interessata da un progetto di taglio di fine turno del ceduo approvato dagli organi competenti e quindi prossimo all'utilizzazione da effettuare immediatamente.

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 58

COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion

Comune Contigliano

Località Valle Santa Croce

Superfici	Assestamentale totale	26,5119
	produttiva	25,7726
	improduttiva	0,7393

Fattori ambientali e di gestione

Posta in basso versante ad un'altitudine prevalente di 660 metri. Esposizione prevalente a nord.

Pendenza prevalente del 70 %, accidentalità forte.

Grave dissesto dovuto a erosione superficiale - incanalata, alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di rotolamento massi; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 20% della particella insufficiente sul restante 80%.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro, Roverella e in subordine Acer (genere), Orniello, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 90% assenti vuoti e lacune, con matricinatura assente; età prevalente accertata 50 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da Helleborus spp, graminacee xerofile rappresentate sporadicamente sulla superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

naturalistiche o conservative secondarimanete la particella svolge, viste le elevate pendenze, anche funzione di protezione idrogeologica.

Orientamento selvicolturale

evoluzione naturale guidata.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 9 cm; altezze prevalente 9 m; N° piante/ha 2500

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 59

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Mosca Castagna

Superfici	Assestamentale totale	19,1012
	produttiva	18,8364
	improduttiva	0,2648

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 750 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza prevalente del 65 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine Orniello, Roverella, Acer (genere), Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 90% presenti vuoti e lacune, con matricinatura insufficiente; età prevalente accertata 42 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Corniolo, Nocciolo, Crataegus (genere), Ginepro comune, Maggiociondolo, Rosa (genere), rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione da effettuare entro 5 anni.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 8.7 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 3840

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 60

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Costa Mosca Castagna

Superfici	Assestamentale totale	7,1686
	produttiva	7,1177
	improduttiva	0,0509

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 750 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità debole.

Possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 70% della particella insufficiente sul restante 30%.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro, Roverella e in subordine Acer (genere), Orniello, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 60% presenti vuoti e lacune, con matricinatura eccessiva; età prevalente accertata 2 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da Helleborus spp, graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

ceduazione

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 10 cm; altezze prevalente 9 m; N° piante/ha 150 i valori si riferiscono alle matricine i valori si riferiscono alle matricine

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 61a

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Costa Mosca Castagna Nord

Superfici	Assestamentale totale	9,8845
	produttiva	9,7937
	improduttiva	0,0908

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 900 metri. Esposizione prevalente a nord-est.

Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Produttivi non boscati 1 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine Orniello, Roverella, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 50% presenti vuoti e lacune, con matricinatura eccessiva; prevalentemente del turno; età prevalente accertata 1 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Ginepro comune, presente sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

ceduazione

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 10 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 150 i valori si riferiscono alle matricine i valori si riferiscono alle matricine

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 61b

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Costa Mosca Castagna Ovest

Superfici	Assestamentale totale	15,2845
	produttiva	15,1646
	improduttiva	0,1199

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 880 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza prevalente del 60 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Produttivi non boscati 0,7 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine Orniello, Roverella, Acer (genere), Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 90% presenti vuoti e lacune, con matricinatura insufficiente; età prevalente accertata 42 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Corniolo, Nocciolo, Crataegus (genere), Ginepro comune, Maggiociondolo, Rosa (genere), rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione da effettuare entro 6-10 anni.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 12.9 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 2340

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 62

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Aravecchia

Superfici	Assestamentale totale	27,5332
	produttiva	27,2218
	improduttiva	0,3114

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 850 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici, volubro; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S.

IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Produttivi non boscati 2,21 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine Roverella, Orniello, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 45 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Nocciolo, Crataegus (genere), Ginepro comune, Maggiociondolo, Rosa (genere), presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione da effettuare entro 5 anni.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 11 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 3000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 63a

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località La Modonnetta

Superfici	Assestamentale totale	
	produttiva	22,2687
	improduttiva	21,9354
		0,3333

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 630 metri. Esposizione prevalente a sud-est.

Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Produttivi non boscati 5,52 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Orniello e in subordine Cerro, Roverella, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: ORNO-OSTRIETO) densità adeguata, grado di copertura pari al 90% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 28 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Corniolo, Nocciolo, Ginepro comune, Maggiociondolo, Rosa (genere), Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Pteridium aquilinum rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione da effettuare entro il periodo successivo di applicazione del piano.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 9 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 2500

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 63b

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Aravecchia Est

Superfici	Assestamentale totale	8,8109
	produttiva	8,6699
	improduttiva	0,1410

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 680 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza prevalente del 65 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sorgenti, fonti, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Produttivi non boscati 2,3 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine Roverella, Orniello, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 45 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Nocciolo, Crataegus (genere), Ginepro comune, Maggiociondolo, Rosa (genere), presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione da effettuare entro il periodo successivo di applicazione del piano.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 11 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 3000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 64

COMPRESA: Fustaie a prevalenza di cerro

Comune Contigliano

Località Colle Crocestone

Superfici	Assestamentale totale	32,5405
	produttiva	32,2974
	improduttiva	0,2431

Fattori ambientali e di gestione

Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1020 metri. Esposizione prevalente a nord.

Pendenza prevalente del 40 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Produttivi non boscati 5,75 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Fustaia monoplana adulta di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Acer (genere), Carpino nero, Orniello, Frassino maggiore (Tipo: CERRETA CON ALTRE LATIFOGLIE DECIDUE) densità scarsa, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune; età prevalente accertata 70 anni. Novellame sporadico, sotto copertura (specie prevalente Cerro) rinnovazione insufficiente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

naturalistiche o conservative.

Orientamento selvicolturale

governo ad alto fusto con un'unica classe di età prevalente.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 20 cm; altezze prevalente 18 m; N° piante/ha 1100

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 65

COMPRESA: Boschi cedui di produzione

Comune Contigliano

Località Colle Crocetta

Superfici	Assestamentale totale	25,6244
	produttiva	25,4312
	improduttiva	0,1932

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 920 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali, strade trattorabili.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Produttivi non boscati 7,1 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine Roverella, Orniello, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 45 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da Nocciolo, Crataegus (genere), Ginepro comune, Maggiociondolo, Rosa (genere), presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

proseguire il governo a ceduo.

Ipotesi di intervento

ceduazione da effettuare entro 6-10 anni.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 11 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 3000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 66a

COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion

Comune Contigliano

Località Fosso Colle Crocetta

Superfici	Assestamentale totale	15,3345
	produttiva	15,2125
	improduttiva	0,1220

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 980 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza prevalente del 45 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto.

Accessibilità buona sul 20% della particella insufficiente sul restante 80%.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero e in subordine Cerro, Roverella, Orniello, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO A PREVELENZA DI CARPINO NERO O CARPIN ORIENTALE CON ALTRE LATIFOLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura insufficiente; età prevalente accertata 55 anni. Novellame sporadico, sotto copertura (specie prevalente Orniello) rinnovazione insufficiente.

Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale

naturalistiche o conservative.

Orientamento selvicolturale

evoluzione naturale guidata.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 9 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 4000

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 66b

COMPRESA: Formazioni arbustive, pascoli, prati-pascoli, incolti erbacei, coltivati

Comune Contigliano

Località Colle Crocetta

Superfici	Assestamentale totale	11,6580
	produttiva	11,6158
	improduttiva	0,0422

Fattori ambientali e di gestione

Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1170 metri. Esposizione prevalente ad est.

Pendenza prevalente del 45 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Danni lievi causati da sovrapascolamento.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto.

Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Formazione erbacea a pascolo.

Cotico a prevalenza di graminacee, continuo e compatto.

Infestanti caratterizzate dalla presenza di *Rosa* sp, *Juniperus communis*, *Crataegus* sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Pascolo libero, della durata di 275 giorni; fruito da bovini, carico normale; disponibilità di acqua nulla.

Componente arborea formata da *Acer* (genere), Faggio, Orniello, Carpino nero, Cerro, Roverella, ricoprente il 10% della superficie.

Rinnovazione assente.

Funzione principale

allevamento zootecnico.

Ipotesi di intervento: decespugliamento da effettuare entro 5 anni.

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 66c

COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion

Comune Contigliano

Località Pozzo Ferraro

Superfici	Assestamentale totale	40,3551
	produttiva	40,0561
	improduttiva	0,2990

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 950 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza prevalente del 60 %, accidentalità forte.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della superficie.

Danni lievi causati da attività venatoria.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti capanni cacciatori.

Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica che in alcuni tratti, in corrispondenza di vallette e aree di moderata pendenza dove aumenta la fertilità e prevale il cerro, è in naturale transizione verso l'alto fusto mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine Roverella, Orniello, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGIE DECIDUE) densità scarsa, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura assente; età prevalente accertata 60 anni. Novellame sporadico, sotto copertura (specie prevalente Cerro) rinnovazione insufficiente. Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale naturalistiche o conservative.

Orientamento selvicolturale evoluzione naturale guidata.

Ipotesi di intervento nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

di diametro prevalente 9 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 4000 tali valori cambiano laddove il popolamento è in evoluzione e si attestano su 14cm di diametro, 13m di altezza per circa 2000 piante e polloni ad ettaro tali valori cambiano laddove il popolamento è in evoluzione e si attestano su 14cm di diametro, 13m di altezza per circa 2000 piante e polloni ad ettaro

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 67

COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion

Comune Contigliano

Località Fosso Capod'Acqua

Superfici	Assestamentale totale	35,4056
	produttiva	35,0944
	improduttiva	0,3112

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 700 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza prevalente del 60 %,

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 9 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 4000 tali valori cambiano laddove il popolamento è in evoluzione e si attestano su 14cm di diametro, 13m di altezza per circa 2000 piante e polloni ad ettaro.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, rocce affioranti su meno del 30% della superficie.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto.

Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica che in alcuni tratti, in corrispondenza di vallette e aree di moderata pendenza dove aumenta la fertilità e prevale il cerro, è in naturale transizione verso l'alto fusto mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine Roverella, Orniello, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura insufficiente; età prevalente accertata 60 anni. Novellame sporadico, sotto copertura (specie prevalente Orniello) rinnovazione insufficiente.

Strato arbustivo formato da Corniolo, Nocciolo, Crataegus (genere), Ginepro comune, Maggiociondolo, Rosa (genere), Ginestra odorosa, presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.

Interventi recenti

Funzione principale naturalistiche o conservative.

Orientamento selvicolturale evoluzione naturale guidata.

Ipotesi di intervento

nessun intervento.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 9 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 4000 tali valori cambiano laddove il popolamento è in evoluzione e si attestano su 14cm di diametro, 13m di altezza per circa 2000 piante e polloni ad ettaro tali valori cambiano laddove il popolamento è in evoluzione e si attestano su 14cm di diametro, 13m di altezza per circa 2000 piante e polloni ad ettaro